

平成30年度 大気環境測定結果一覧表

(1) 二酸化硫黄

(単位 : ppm)

採取場所	月日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	環境基準値
羽村市立羽村第三中学校 (屋上)(羽村市内)	最高値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1時間値の1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ 1時間値が 0.1ppm以下で あること。
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
羽村市立松林小学校 (屋上)(羽村市内)	最高値	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
	平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	
羽村市立あさひ公園 (地上)(羽村市内)	最高値	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
瑞穂町立瑞穂第四小学校 (屋上)(瑞穂町内)	最高値	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
瑞穂町富士見公園 (地上)(瑞穂町内)	最高値	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

(2) 二酸化窒素

(単位 : ppm)

採取場所	月日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	環境基準値
羽村市立羽村第三中学校 (屋上)(羽村市内)	平均値	0.012	0.008	0.006	0.007	0.009	0.008	0.010	0.015	0.013	0.010	0.012	0.014	0.017	0.015	1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまで のゾーン内又は、それ以下 であること。
	平均値	0.012	0.008	0.007	0.007	0.009	0.008	0.011	0.016	0.019	0.018	0.010	0.017	0.021	0.019	
羽村市立あさひ公園 (地上)(羽村市内)	平均値	0.011	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.010	0.014	0.014	0.012	0.009	0.016	0.020	0.017	
	平均値	0.012	0.008	0.006	0.006	0.009	0.008	0.011	0.014	0.014	0.013	0.011	0.015	0.020	0.015	
瑞穂町立瑞穂第四小学校 (屋上)(瑞穂町内)	平均値	0.012	0.008	0.006	0.006	0.009	0.008	0.011	0.014	0.014	0.013	0.011	0.015	0.020	0.015	
	平均値	0.011	0.011	0.006	0.005	0.008	0.008	0.011	0.014	0.014	0.012	0.009	0.015	0.021	0.015	

(3) 浮遊粒子状物質

(単位 : mg/m³)

採取場所	月日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	環境基準値
羽村市立羽村第三中学校 (屋上)(羽村市内)	最高値	0.029	0.032	0.019	0.030	0.038	0.031	0.030	0.035	0.022	0.025	0.023	0.031	0.033	0.025	1時間値の1日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、か つ1時間値が0.20mg/m ³ 以 下であること。
	平均値	0.018	0.016	0.013	0.019	0.023	0.018	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.020	0.020	0.015	
羽村市立松林小学校 (屋上)(羽村市内)	最高値	0.025	0.018	0.021	0.032	0.027	0.025	0.026	0.042	0.018	0.019	0.026	0.027	0.040	0.021	
	平均値	0.017	0.013	0.014	0.020	0.019	0.016	0.015	0.013	0.010	0.009	0.010	0.015	0.020	0.012	
羽村市立あさひ公園 (地上)(羽村市内)	最高値	0.030	0.023	0.016	0.039	0.031	0.029	0.029	0.026	0.021	0.016	0.018	0.024	0.033	0.026	
	平均値	0.017	0.012	0.010	0.020	0.019	0.018	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010	0.014	0.016	0.013	
瑞穂町立瑞穂第四小学校 (屋上)(瑞穂町内)	最高値	0.028	0.021	0.018	0.029	0.032	0.024	0.026	0.045	0.019	0.019	0.018	0.025	0.038	0.028	
	平均値	0.018	0.013	0.010	0.019	0.019	0.016	0.013	0.015	0.011	0.011	0.010	0.016	0.022	0.012	
瑞穂町富士見公園 (地上)(瑞穂町内)	最高値	0.030	0.023	0.018	0.030	0.055	0.027	0.021	0.039	0.031	0.023	0.025	0.054	0.054	0.029	
	平均値	0.018	0.012	0.009	0.018	0.020	0.016	0.013	0.015	0.015	0.015	0.014	0.021	0.023	0.014	

(4) 塩化水素


(単位 : ppm)

採取場所	月日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	目標環境濃度
羽村市立羽村第三中学校 (屋上)(羽村市内)	測定値	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.02
	測定値	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	
羽村市立あさひ公園 (地上)(羽村市内)	測定値	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	測定値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
瑞穂町立瑞穂第四小学校 (屋上)(瑞穂町内)	測定値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	測定値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	

○ 大気環境中の測定結果について(参考)

■ ダイオキシン類の測定結果

単位:pg-TEQ/m³




採取場所	月 日		工事前	工事後	全炉停止中	工事後			全炉停止中	工事後				
			平成24年 ~平成26年	平成27年	平成28年			平成29年			平成30年			
				12月	1月	2月	6月	12月	1月	3月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	測定値	0.051	0.033	0.032	0.039	0.0083	0.011	0.014	0.013	0.0080	0.0074	0.011	0.019
羽村市立松林小学校	屋上※5	測定値	0.045	0.032	0.015	0.016	0.0080	0.010	0.010	0.015	0.0089	0.014	0.031	0.013
羽村市立あさひ公園	地上※6	測定値	0.029	0.032	0.031	0.034	0.010	0.011	0.016	0.0083	0.0084	0.016	0.011	0.013
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	測定値	0.067	0.036	0.018	0.035	0.0085	0.0086	0.0083	0.014	0.011	0.014	0.012	0.013
瑞穂町富士見公園	地上※6	測定値	0.053	0.037	0.045	0.035	0.010	0.011	0.010	0.0084	0.0081	0.016	0.011	0.019

※ 詳細な測定結果については、「ダイオキシン類測定結果」をご覧ください。


■ 二酸化硫黄の測定結果(1時間の最高値)

単位:ppm




採取場所	月 日		工事前	工事後	全炉停止中	工事後			全炉停止中	工事後				
			平成24年 ~平成26年	平成27年	平成28年			平成29年			平成30年			
				12月	1月	2月	6月	12月	1月	3月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.008	0.003	0.004	0.007	0.003	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.009	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.011	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.005	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001

■ 二酸化硫黄の測定結果(1日の平均値)




採取場所	月 日	工事前 平成24年 ～平成26年	工事後 平成27年 12月	全炉停止中 1月	工事後			全炉停止中 1月	工事後			平成30年 6月 12月			
					平成28年						平成29年				
					2月	6月	12月		3月	6月	12月				
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	平均値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	
瑞穂町富士見公園	地上※6	平均値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	

■ 二酸化窒素の測定結果(1日の平均値)




採取場所	月 日	工事前 平成24年 ～平成26年	工事後 平成27年 12月	全炉停止中 1月	工事後			全炉停止中 1月	工事後			平成30年 6月 12月			
					平成28年						平成29年				
					2月	6月	12月		3月	6月	12月				
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	0.033	0.027	0.019	0.015	0.020	0.023	0.027	0.020	0.013	0.019	0.012	0.017	
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.031	0.028	0.020	0.015	0.020	0.031	0.029	0.018	0.015	0.018	0.012	0.021	
羽村市立あさひ公園	地上※6	平均値	0.028	0.024	0.013	0.015	0.020	0.025	0.029	0.021	0.008	0.019	0.011	0.020	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.029	0.026	0.015	0.018	0.018	0.024	0.028	0.019	0.015	0.027	0.012	0.020	
瑞穂町富士見公園	地上※6	平均値	0.035	0.025	0.027	0.025	0.019	0.023	0.027	0.021	0.014	0.028	0.011	0.021	

■ 浮遊粒子状物質の測定結果(1時間の最高値)




採取場所	月 日		工事前	工事後	全炉停止中	工事後				全炉停止中	工事後			
			平成24年 ~平成26年	平成27年	平成28年				平成29年	平成30年				
			12月	1月	2月	6月	12月	1月	3月	6月	12月	6月	12月	
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.117	0.084	0.051	0.037	0.045	0.075	0.045	0.073	0.060	0.062	0.038	0.035
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.077	0.079	0.065	0.042	0.043	0.075	0.048	0.070	0.059	0.055	0.032	0.042
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.090	0.085	0.042	0.036	0.044	0.055	0.046	0.067	0.058	0.056	0.039	0.033
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.104	0.078	0.061	0.043	0.048	0.070	0.052	0.087	0.054	0.046	0.032	0.045
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.101	0.088	0.046	0.037	0.042	0.074	0.040	0.067	0.052	0.044	0.055	0.054

■ 浮遊粒子状物質の測定結果(1日の平均値)



採取場所	月 日		工事前	工事後	全炉停止中	工事後				全炉停止中	工事後			
			平成24年 ~平成26年	平成27年	平成28年				平成29年	平成30年				
			12月	1月	2月	6月	12月	1月	3月	6月	12月	6月	12月	
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	0.046	0.042	0.023	0.023	0.032	0.035	0.023	0.050	0.040	0.019	0.023	0.020
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.045	0.043	0.025	0.025	0.031	0.035	0.023	0.048	0.037	0.023	0.020	0.020
羽村市立あさひ公園	地上※6	平均値	0.045	0.043	0.020	0.024	0.036	0.029	0.020	0.040	0.037	0.021	0.020	0.016
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.048	0.045	0.027	0.023	0.033	0.031	0.024	0.059	0.038	0.018	0.019	0.022
瑞穂町富士見公園	地上※6	平均値	0.046	0.045	0.022	0.024	0.033	0.035	0.023	0.040	0.035	0.020	0.020	0.023

■ 塩化水素の測定結果(測定期間中の最大値)




採取場所	月 日	工事前 平成24年 ～平成26年	工事後 平成27年 12月	全炉停止中 1月	平成28年				全炉停止中 1月	平成29年			平成30年	
					2月	6月	12月	3月		6月	12月	6月	12月	
														測定値
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	測定値※4	0.008	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001
羽村市立松林小学校	屋上※5	測定値	0.006	<0.001	0.003	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
羽村市立あさひ公園	地上※6	測定値	0.008	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	測定値	0.004	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	<0.001
瑞穂町富士見公園	地上※6	測定値	0.008	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001	0.001

- ※ 1 測定地点の変更:平成23年度から瑞穂町むさしの会館を瑞穂町富士見公園に変更して測定しています。
- ※ 2 最高値とは、1時間における最大の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1時間値の最大の値を採用しています。
- ※ 3 平均値とは、1日における平均の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1日平均値の最大の値を採用しています。
- ※ 4 測定期間中における最大の値を採用しています。
- ※ 5 地上から約15.0mとなっています。
- ※ 6 地上から約1.5mとなっています。
- ※ 7 地上から約11.4mとなっています。
- ※ 8 「全炉停止中」とは、焼却炉が全て停止している期間です。
- ※ 9 「工事前」とは、基幹的設備改良工事(排ガス再加熱器の停止)が実施される前の期間です。また、記載されている数値は、工事実施直前の過去3年間の最大値を採用しています。
- ※10 「工事後」とは、基幹的設備改良工事(排ガス再加熱器の停止)が実施された後の期間です。

○ 大気環境中の測定結果、夏季と冬季の比較について(参考)

■ 二酸化硫黄の測定結果(夏季)


単位:ppm



採取場所			年度	夏季				
				平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.008	0.004	0.003	0.003	0.001	
		平均値※3	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	
		平均値	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.001	0.004	0.004	0.002	0.002	
		平均値	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002	
		平均値	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.001	0.004	0.007	0.004	0.002	
		平均値	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	

■ 二酸化窒素の測定結果(夏季)


単位:ppm



採取場所			年度	夏季				
				平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	0.012	0.011	0.020	0.013	0.012	
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.014	0.010	0.020	0.015	0.012	
羽村市立あさひ公園	地上※6	平均値	0.014	0.015	0.020	0.008	0.011	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.015	0.013	0.018	0.015	0.012	
瑞穂町富士見公園	地上※6	平均値	0.016	0.010	0.019	0.014	0.011	

■ 二酸化硫黄の測定結果(冬季)


単位:ppm



採取場所			年度	冬季				
				平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	
		平均値※3	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	
		平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	
		平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.008	0.003	0.004	0.001	0.001	
		平均値	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	
		平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	

■ 二酸化窒素の測定結果(冬季)


単位:ppm



採取場所			年度	冬季				
				平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	0.027	0.027	0.023	0.019	0.017	
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.024	0.028	0.031	0.018	0.021	
羽村市立あさひ公園	地上※6	平均値	0.024	0.024	0.025	0.019	0.020	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.026	0.026	0.024	0.027	0.020	
瑞穂町富士見公園	地上※6	平均値	0.027	0.025	0.023	0.028	0.021	

■ 浮遊粒子状物質の測定結果(夏季)


単位:mg/m³



採取場所		年度	夏季				
			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.071	0.046	0.045	0.060	0.038
		平均値※3	0.046	0.031	0.032	0.040	0.023
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.063	0.040	0.043	0.059	0.032
		平均値	0.045	0.027	0.031	0.037	0.020
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.065	0.044	0.044	0.058	0.039
		平均値	0.045	0.027	0.036	0.037	0.020
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.071	0.039	0.048	0.054	0.032
		平均値	0.047	0.030	0.033	0.038	0.019
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.067	0.042	0.042	0.052	0.055
		平均値	0.046	0.028	0.033	0.035	0.020

■ 塩化水素の測定結果(夏季)

単位:ppm




採取場所		年度	測定値※4	夏季				
				平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	測定値※4	0.001	0.002	0.001	0.004	0.001	
羽村市立松林小学校	屋上※5	測定値	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	測定値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	測定値	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	
瑞穂町富士見公園	地上※6	測定値	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	

※1 測定地点の変更:平成23年度から瑞穂町むさしの会館を瑞穂町富士見公園に変更して測定しています。
 ※2 最高値とは、1時間における最大の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1時間値の最大の値を採用しています。
 ※3 平均値とは、1日における平均の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1日平均値の最大の値を採用しています。
 ※4 測定期間中における最大の値を採用しています。

■ 浮遊粒子状物質の測定結果(冬季)


単位:mg/m³



採取場所		年度	冬季				
			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.071	0.084	0.075	0.062	0.035
		平均値※3	0.038	0.042	0.035	0.019	0.020
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.058	0.079	0.075	0.055	0.042
		平均値	0.034	0.043	0.035	0.023	0.020
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.061	0.085	0.055	0.056	0.033
		平均値	0.036	0.043	0.029	0.021	0.016
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.063	0.078	0.070	0.046	0.045
		平均値	0.039	0.045	0.031	0.018	0.022
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.062	0.088	0.074	0.044	0.054
		平均値	0.039	0.045	0.035	0.020	0.023

■ 塩化水素の測定結果(冬季)

単位:ppm



採取場所		年度	測定値※4	夏季				
				平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	測定値※4	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.001	
羽村市立松林小学校	屋上※5	測定値	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	測定値	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	測定値	0.003	0.001	<0.001	0.002	<0.001	
瑞穂町富士見公園	地上※6	測定値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	

※5 地上から約15.0mとなっています。
 ※6 地上から約1.5mとなっています。
 ※7 地上から約11.4mとなっています。