

(1) 二 酸 化 硫 黄

環境基準値

1時間値の1日平均値が
0.04ppm以下であり、かつ
1時間値が 0.1ppm以下
であること。

(単位 : ppm)

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又は、それ以下であること。

(単位 : mg/m^3)


1時間値の1日平均値が
0.10mg/m³以下であり、かつ
1時間値が0.20mg/m³
以下であること。

(単位 : ppm)

0.02


[illegible]

■ 二酸化窒素の測定結果(1日の平均値)




採取場所			令和 3年		令和 4年		令和 5年		令和 6年		令和 7年		令和 8年	
			6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	0.011	0.017	0.008	0.018	0.013	0.018	0.009	0.016	0.010	0.014	0.007	
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.011	0.018	0.009	0.016	0.011	0.017	0.012	0.017	0.011	0.017	0.008	
羽村市立あさひ公園	地上※6	平均値	0.010	0.018	0.009	0.017	0.011	0.015	0.009	0.014	0.007	0.014	0.007	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.011	0.018	0.010	0.016	0.013	0.018	0.011	0.011	0.011	0.015	0.008	
瑞穂町富士見公園	地上※6	平均値	0.013	0.024	0.014	0.015	0.014	0.020	0.012	0.021	0.012	0.018	0.010	

■ 浮遊粒子状物質の測定結果(1時間の最高値)




採取場所			令和 3年		令和 4年		令和 5年		令和 6年		令和 7年		令和 8年	
			6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.031	0.040	0.055	0.036	0.046	0.041	0.045	0.017	0.025	0.034	0.060	
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.040	0.101	0.048	0.022	0.044	0.038	0.038	0.017	0.027	0.032	0.062	
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.055	0.029	0.042	0.030	0.037	0.040	0.034	0.018	0.027	0.038	0.065	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.043	0.031	0.062	0.020	0.036	0.036	0.036	0.031	0.030	0.031	0.058	
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.038	0.037	0.045	0.021	0.041	0.043	0.039	0.034	0.026	0.043	0.058	

■ 浮遊粒子状物質の測定結果(1日の平均値)



採 取 場 所			令和 3年		令和 4年		令和 5年		令和 6年		令和 7年		令和 8年	
			6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	0.021	0.020	0.035	0.011	0.029	0.026	0.028	0.011	0.019	0.018	0.026	
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.017	0.020	0.030	0.013	0.027	0.024	0.022	0.012	0.020	0.019	0.026	
羽村市立あさひ公園	地上※6	平均値	0.027	0.018	0.025	0.013	0.026	0.025	0.021	0.010	0.022	0.019	0.027	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.024	0.017	0.023	0.012	0.024	0.021	0.024	0.012	0.022	0.018	0.027	
瑞穂町富士見公園	地上※6	平均値	0.023	0.019	0.028	0.013	0.027	0.023	0.026	0.011	0.019	0.024	0.025	

■ 塩化水素の測定結果(測定期間中の最大値)



採 取 場 所			令和 3年		令和 4年		令和 5年		令和 6年		令和 7年		令和 8年	
			6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月	6月	12月
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	測定値※4	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
羽村市立松林小学校	屋上※5	測定値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	測定値	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	測定値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
瑞穂町富士見公園	地上※6	測定値	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	

※ 1 測定地点の変更:平成23年度から瑞穂町むさしの会館を瑞穂町富士見公園に変更して測定しています。

※ 2 最高値とは、1時間における最大の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1時間値の最大の値を採用しています。

※ 3 平均値とは、1日における平均の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1日平均値の最大の値を採用しています。

※ 4 測定期間中における最大の値を採用しています。

※ 5 地上から約15.0mとなっています。

※ 6 地上から約1.5mとなっています。


※ 7 地上から約11.4mとなっています。

※ 8 「全炉停止中」とは、焼却炉が全て停止している期間です。また、記載されている数値は、全炉停止期間中の過去3年間(5地点中)の最大値を採用しています。

※ 9 「工事前」とは、基幹的設備改良工事(排ガス再加熱器の停止)が実施される前の期間です。また、記載されている数値は、工事実施直前3年間(5地点中)の最大値を採用しています。


○ 大気環境中の測定結果、夏季と冬季(過去5年間)の比較について(参考)

■ 二酸化硫黄の測定結果(夏季) 単位:ppm




採取場所			年 度				
			夏 季				
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
		平均値※3	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		平均値	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		平均値	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
		平均値	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		平均値	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002

■ 二酸化窒素の測定結果(夏季) 単位:ppm




採取場所			年 度				
			夏 季				
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
		平均値	0.008	0.013	0.009	0.010	0.007
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.009	0.011	0.012	0.011	0.008
		平均値	0.009	0.011	0.009	0.007	0.007
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.010	0.013	0.011	0.011	0.008
		平均値	0.014	0.014	0.012	0.012	0.010

■ 二酸化硫黄の測定結果(冬季) 単位:ppm




採取場所			年 度				
			冬 季				
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
		平均値※3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		平均値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002

■ 二酸化窒素の測定結果(冬季) 単位:ppm



採取場所			年 度				
			冬 季				
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	平均値※3	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
		平均値	0.018	0.018	0.016	0.014	0.014
羽村市立松林小学校	屋上※5	平均値	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017
		平均値	0.017	0.015	0.014	0.014	0.014
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	平均値	0.016	0.018	0.011	0.015	0.015
		平均値	0.015	0.020	0.021	0.018	0.018


■ 浮遊粒子状物質の測定結果(夏季)



採取場所			年度				
			夏季				
採取場所	採取高さ	測定項目	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.055	0.046	0.045	0.025	0.060
		平均値※3	0.035	0.029	0.028	0.019	0.026
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.048	0.044	0.038	0.027	0.062
		平均値	0.030	0.027	0.022	0.020	0.026
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.042	0.037	0.034	0.027	0.065
		平均値	0.025	0.026	0.021	0.022	0.027
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.062	0.036	0.036	0.030	0.058
		平均値	0.023	0.024	0.024	0.022	0.027
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.045	0.041	0.039	0.026	0.058
		平均値	0.028	0.027	0.026	0.019	0.025

■ 塩化水素の測定結果(夏季)

単位:ppm



採取場所			年度				
			夏季				
採取場所	採取高さ	測定項目	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	測定値※4	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001
羽村市立松林小学校	屋上※5	測定値	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001
羽村市立あさひ公園	地上※6	測定値	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	測定値	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
瑞穂町富士見公園	地上※6	測定値	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001


※1 測定地点の変更:平成23年度から瑞穂町むさしの会館を瑞穂町富士見公園に変更して測定しています。

※2 最高値とは、1時間における最大の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1時間値の最大の値を採用しています。

※3 平均値とは、1日における平均の値です。なお、記載されている数値は、測定期間中における1日平均値の最大の値を採用しています。

※4 測定期間中における最大の値を採用しています。


■ 浮遊粒子状物質の測定結果(冬季)



採取場所			年度				
			冬季				
採取場所	採取高さ	測定項目	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	最高値※2	0.036	0.041	0.017	0.034	
		平均値※3	0.011	0.026	0.011	0.018	
羽村市立松林小学校	屋上※5	最高値	0.022	0.038	0.017	0.032	
		平均値	0.013	0.024	0.012	0.019	
羽村市立あさひ公園	地上※6	最高値	0.030	0.040	0.018	0.038	
		平均値	0.013	0.025	0.010	0.019	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	最高値	0.020	0.036	0.031	0.031	
		平均値	0.012	0.021	0.012	0.018	
瑞穂町富士見公園	地上※6	最高値	0.021	0.043	0.034	0.043	
		平均値	0.013	0.023	0.011	0.024	

■ 塩化水素の測定結果(冬季)

単位:ppm



採取場所			年度				
			冬季				
採取場所	採取高さ	測定項目	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
羽村市立羽村第三中学校	屋上※5	測定値※4	0.001	0.001	0.001	<0.001	
羽村市立松林小学校	屋上※5	測定値	0.001	0.001	0.001	<0.001	
羽村市立あさひ公園	地上※6	測定値	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	
瑞穂町立瑞穂第四小学校	屋上※7	測定値	0.001	<0.001	0.001	<0.001	
瑞穂町富士見公園	地上※6	測定値	0.001	0.001	<0.001	<0.001	

※5 地上から約15.0mとなっています。

※6 地上から約1.5mとなっています。

※7 地上から約11.4mとなっています。